

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御纂醫宗金鑑卷七十八



詳校官主事_臣陳木

欽定四庫全書薈要

御纂醫宗金鑑卷七十八

編輯眼科心法要訣目錄

外障總名歌

暴赤生翳歌

方附

血灌瞳人歌

方附

瞼鞭睛疼歌

方附

赤膜下垂歌

方附



黃膜上衝歌 方附

蠅睛疼痛歌 方附

旋螺尖起歌 方附

努肉攀睛歌 方附

鷄冠蜆肉歌 方附

神崇疼痛歌 方附

突起睛高歌 方附

漏睛膿出歌 方附

鵲眼凝睛歌

方附

倒睫拳毛歌

方附

胞肉膠凝歌

方附

兩眦赤脈歌

方附

花翳白陷歌

方附

黑翳如珠歌

方附

釘翳根深歌

方附

風牽喝僻歌

方附

冰瑕翳深歌

方附

兩瞼粘睛歌

方附

玉翳浮滿歌

方附

逆順生翳歌

方附

風牽瞼出歌

方附

瞼生風粟椒瘡歌

方附

混睛歌

方附

被物撞破歌

方附

撞刺生翳歌

方附

痛如鍼刺歌

方附

眼癢歌

方附

衝風淚出歌

方附

風赤瘡癩歌

方附

暴風客熱歌

方附

傷寒熱病後患目歌

方附

肝虛積熱歌

方附

因他患後生翳歌

方附

睥生痰核歌

方附

天行赤眼歌

方附

小兒青盲歌

方附

胎風赤爛歌

方附

癰瘡入眼歌

方附

輓轡轉關歌

方附

小兒生贅歌

方附

小兒疳眼歌

方附

小兒通睛歌

方附

眯目飛塵飛絲歌

方附

補遺

能遠怯近歌

方附

能近怯遠歌

方附

瞳神散大歌

方附

瞳神縮小歌

方附

乾澀昏花歌 方附

白眼痛歌 方附

女子逆經歌 方附

行經目痛歌 方附

妊娠目病歌 方附

產後病目歌 方附

附外治方

欽定四庫全書醫要卷一萬五百三十二

子部

御纂醫宗金鑑卷七十八

編輯眼科心法要訣

外障總名歌

外障暴赤血灌瞳鞭睛赤垂與黃衝
蠅睛旋螺並努肉
鷄冠肉崇疼同突睛漏睛連鵝眼拳毛倒睫胞凝逢
皆赤花陷及黑釘喎僻水瑕粘睛并玉翳水輪逆順障
瞼出風粟又混睛撞破撞刺及鍼刺眼癢淚出瘡癰生

客熱傷寒並肝熱因他痰核天水行青盲赤爛癰瘡病
轉關生贅疳眼名小兒通睛恙雖小還有眯目證為輕
此為外障四十八熟讀方知名證情

註

外障者或因內熱或因外邪或內外合邪致生目
赤腫痛翳膜等證也暴者暴赤生翳也血灌瞳者
血灌瞳人也鞭睛者瞼鞭睛疼也赤垂者赤膜下
垂也黃衝者黃膜上衝也蠅睛者形如蠅睛而疼
痛也旋螺者形如旋螺尖起也努肉者努肉攀睛

也崇疼者神崇疼痛也突睛者突起睛高也漏睛者漏睛膿出也鵝眼者鵝眼凝睛也胞凝者胞肉膠凝也眇赤者兩眇赤脈也花陷者花翳白陷也黑者黑翳如珠也釘者釘翳根深也喎僻者風牽喎僻也冰瑕者冰瑕翳深也粘睛者兩瞼粘睛也玉翳者玉翳浮滿也水輪者膜入水輪也逆順者逆順生翳也撞破者被物撞破也撞刺者撞刺生翳也鍼刺者痛如鍼刺也淚出者衝風淚出也瘡

瘕者風赤瘡瘕也客熱者暴風客熱也傷寒者傷寒熱病後患目也肝熱者肝虛積熱也因他者因他病後生翳也痰核者脾生痰核也天水者天水行後赤眼也赤爛者胎風赤爛也癰瘡者癰瘡入眼也轉關者轆轤轉關也生贅者瞼中生贅也此外障四十八證之總名讀者誠能熟習玩味自因病而各得其情矣

暴赤生翳歌

暴赤生翳心肝病風熱上壅痛難當赤腫熱淚羞明癢
最宜劇洗出血良初起先用蘆根飲黑連消黃芩與防
去翳鎮肝藁石決辛薯參苓車味羌

註暴赤生翳其證赤腫生翳癢痛難當時流熱淚羞
明乃心肝二經風熱上壅攻目所致宜劇洗出血
服蘆根飲子清其內熱後服鎮肝丸劇音廉劇者
或以鍼鋒微刺之或以燈心草微刮之也

蘆根飲子

蘆根

一錢

黑參

一錢五分

黃連

一錢

芒消

一錢

大黃

一錢

黃芩

一錢五分

防風

一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

鎮肝丸方

藁本

一兩五錢

石決明

二兩
煨

細辛

三錢

山藥

炒

人參

茯苓

車前子

各一兩

五味子

三錢

羌活

一兩

右羅為細末煉蜜為丸如桐子大空心茶清送下
三錢

血灌瞳人歌

血灌瞳人目睛痛猶如血灌色相同膽汁肝血因熱耗
血為火迫灌睛瞳急用止痛沒藥散消黃血竭引茶清

痛止大黃當歸散賊忒梔子菊蘇紅

註

血灌瞳人目睛疼痛瞳人如血灌紅色緣肝血熱
耗膽汁皆虧血因火迫灌入瞳中宜服止痛沒藥
散止疼後服大黃當歸散

止痛沒藥散方

沒藥

二兩

芒消

一兩半

大黃

一兩半

血竭

一兩

右搗篩為細末食後熱茶清調下一錢

大黃當歸散方

大黃

一兩

當歸

二錢

木賊

一兩

黃芩

一兩

梔子

五錢

菊花

三錢

蘓木

五錢

紅花

八錢

右為細末令勻每服二錢食遠茶清調下

驗鞭睛疼歌

驗鞭睛疼胞腫鞭瘀血翳膜目睛疼膈中積熱肝風盛

外塗焮腫劇癢紅涼膈消黃車前黑黃芩知母梔仁羌
註 瞼鞭睛疼初患之時時覺疼脹久則瞼胞腫鞭睛
珠疼痛此緣膈中積熱肝經風毒上衝於目宜劇
洗去瘀外塗焮腫膏內服涼膈散

焮腫膏

方見卷末

涼膈散方

芒消

大黃

車前子 各一錢

黑參 一錢半

黃芩

知母

梔子 炒

羌蔚子 各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後溫服

赤膜下垂歌

赤膜下垂覆睛瞳赤膜從氣下垂風此屬肝肺熱衝眼
淚流痛癢如朱紅羚羊知母黃芩黑桔梗柴胡梔子羌
註 赤膜下垂初患之時氣輪上邊起赤膜一片垂至

風輪下覆瞳人緣肝肺之熱衝於眼內致生赤膜
淚流痛癢宜服羚羊飲

羚羊飲

羚羊角

一錢五分

知母

黃芩

黑參

桔梗

柴胡

梔子

各一錢

茺蔚子

二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

黃膜上衝歌

黃膜一片氣輪起上衝風輪覆蓋瞳赤澁淚眇疼痛極
此因脾胃熱風攻通脾瀉胃黃芩黑防軍知母梔膏羌
立應白芷羊躑躅鵝不食草麝歸雄

註

黃膜上衝自氣輪而起一片黃膜從下直衝風輪
上掩瞳人乃脾胃風熱上衝於眼致生黃膜淚流
赤澁疼痛極甚宜通脾瀉胃湯外啗立應散

通脾瀉胃湯方

黃芩

一錢五分

黑參

防風

大黃

知母

炒

梔子

各一錢
炒

石膏

二錢
煨

荒蔚子

二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠去渣溫服

立應散方

白芷

羊躑躅花

減半

驚不食草

洗淨晒乾

麝香

少許

當歸

雄黃 各等分
另研後入

右為細末每用少許含水嚙鼻內去盡濁涕淚出
為度

蠅睛疼痛歌

蠅睛努出蠅睛形烏珠極痛澁羞明肝膽積熱腎虛熱
虛軟不疼實鞭疼實者瀉肝車地骨消黃知母黑柴羌
虛宜鎮腎味知地山藥兔辛石決靈

註 蠅睛之證烏睛努出如豆如珠形似蠅睛疼痛極

甚澁淚羞明初起為實鞭而極痛久則為虛軟而
不疼總因肝膽積熱衝睛腎中虛熱注目所致實
者宜瀉肝湯虛者用鎮腎決明丸

瀉肝湯方

車前子

地骨皮

芒消 各一錢

大黃

知母 各一錢半

黑參 一錢

柴胡 二錢

羌蔚子 二錢

右為粗末以水二盞煎至八分去渣空心溫服

鎮腎決明丸方

五味子

半兩

知母

炒

生地黃

山藥

各一兩半
炒

兔絲子

一兩

細辛

半兩

石決明

一兩
煨

右為細末煉蜜為丸桐子大空心茶清送三錢

旋螺尖起歌

旋螺尖起如螺殼烏睛色變極痛疼殼形尖起色青黑
肝經積熱血瘀凝輕宜瀉腦防辛梗赤芍天冬五味荒
重者瀉肝消黃桔柴苓知母細車行

註 旋螺外障氣輪之內烏珠色變青白如螺螄之殼
其色初青久黑其形尖圓乃肝經積熱亢極瘀血
凝滯所致輕者宜瀉腦湯重者用瀉肝飲子

瀉腦湯方

防風 二錢

細辛 五分

桔梗 一錢

赤芍藥 一錢

天門冬 一錢

去心

五味子 五分

芫蔚子 二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

瀉肝飲子

芒消

大黃

桔梗

柴胡

黃芩

知母 炒

細辛

車前子 各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

努肉攀睛歌

努肉攀睛大眦起初侵風輪久掩瞳或癢或疼漸積厚
赤爛多年肺熱壅初起紫金膏點效久宜鉤割熨烙攻
內服除風湯蔚桔細辛連味大黃風

註 努肉攀睛之證起於大眦初則漸侵風輪久則掩
過瞳人或癢或痛漸漸積厚此證多因赤爛年久

或肺經風熱壅盛所致初起可點紫金膏努瘀自退久則堅韌難消必須鉤割熨烙後服除風湯除風湯方

羌蔚子 一錢

桔梗 一錢

細辛 五分

黃連 一錢

五味子 五分

大黃 一錢

防風 一錢

右為末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

紫金膏

方見卷末

雞冠蚬肉歌

雞冠蚬肉內皆生胃心積熱共肝風或青或赤如雞蚬
輕侵風輪重掩瞳鉤割後服抽風桔消黃車黑細苓風
荒蔚丸苓石決黑軍苓山藥地黃荒

註雞冠蚬肉之證起於脾腎之內或青或赤如雞冠
蚬肉之形漸漸而長從大皆侵及風輪久則掩及

全目此乃脾胃積熱肝風上衝所致先宜用手法
鈎割後服抽風湯或羌蔚丸

抽風湯方

桔梗 一錢

芒消 一錢五分

大黃 一錢

車前子 一錢

黑參 一錢五分

細辛 一錢

黃芩 一錢五分

防風 二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

卷七十八
羌蔚丸方

黃芩

一兩

石決明

一兩
煨

黑參

一兩

大黃

一兩

茯苓

一兩

山藥

二兩
炒

生地黃

一兩五錢

羌蔚子

二兩

右為細末煉蜜為丸桐子大空心茶清下三錢

神崇疼痛歌

神崇疼痛忽然發胞熱睛疼緣肺肝洗肝散用消黃桔

梔子黃芩知母漆黑參熱甚加歸地外點還宜石燕丹
註神崇疼痛之證平素無病忽然發動瞼皮火熱睛
珠如刺極痛難當此肺肝風熱上攻於眼不可劇
洗宜服酒調洗肝散外點石燕丹

酒調洗肝散方

朴消

大黃

桔梗

梔子

黃芩

知母
炒

黑參 各等分

熱甚者加生地黃當歸尾

右為末每服二三錢溫酒調下日服二次

石燕丹

方見卷末

突起睛高歌

突起睛高珠腫疼風熱毒火上衝睛鍼後退熱桔梗飲
消黃芩芍黑苓風還睛五味參苓細山藥車前防遠芫

註
突起睛高之證緣風熱火毒上衝於眼疼痛難忍
睛珠突高脹起宜先用鍼出其青涎毒水後服退
熱桔梗飲子用還睛丸調理可愈

退熱桔梗飲子

桔梗

芒消

大黃

羌蔚子

白芍藥

炒

黑參

黃芩

防風 各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

還睛丸方

五味子

半兩

人參

二兩

茯苓

一兩

細辛

半兩

山藥

一兩

車前子

防風

遠志

羌蔚子

各一兩

右為細末煉蜜丸桐子太空心茶清送下三錢

漏睛膿出歌

漏睛膿出瞼眥間或流膿汁或清涎目無翳障不疼痛
風熱攻衝心火炎竹葉瀉經湯柴瀉升麻竹葉草車前
黃芩草決川羌活苓芍將軍梔子連

註漏睛膿出之證生於瞼眥或流膿水或淌清涎目
無翳障不疼不痛乃風熱攻衝心火上炎宜用竹
葉瀉經湯主之

竹葉瀉經湯方

柴胡 五分

澤瀉 四分

升麻 五分

青竹葉 十片

甘草 炙 五分

車前子 四分

黃芩 六分

草決明 四分

川羌活 五分

白茯苓 四分

赤芍藥 四分

大黃 六分

梔子仁 炒 五分

川黃連 五分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後溫服

鵲眼凝睛歌

鵲眼凝睛睛突定目珠脹鞭痛難當積熱上衝腦熱注
外用摩風鍼血良內服瀉肝湯桔蔚柴防苓黑共消黃
註鵲眼凝睛之證睛突於外不能動轉堅鞭高努如
鵲眼脹滿疼痛難忍此積熱上衝腦中風熱壅注
於目所致宜先用金鍼出血瀉毒外敷摩風膏內
服瀉肝湯

摩風膏

方見卷末

瀉肝湯方

桔梗

羌蔚子

柴胡

防風

黃芩

黑參

芒消

大黃

各等分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

倒睫拳毛歌

倒睫拳毛內刺睛皮鬆弦緊癢兼疼礮澁難開胞瞼爛
肝風脾熱兩相壅細辛湯用知朮黑軍細防風桔梗
註倒睫拳毛之證由皮鬆弦緊故拳毛倒入內刺睛
珠礮澁難開眼胞赤爛癢而兼疼此乃脾熱肝風
合邪上壅所致宜用細辛湯內清邪熱外散風邪
也

細辛湯方

知母 二錢

朮 二錢

黑參 一錢

大黃 一錢

細辛 一錢

防風 二錢

桔梗 一錢

羚羊角 一錢
鎊

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

胞肉膠凝歌

胞肉膠凝胞肉腫初小漸大摩隱瞳胃脾風熱上攻目
通脾瀉胃熱風清

註胞肉膠凝之證脾中蠱肉壅起初小漸大摩隱瞳

人眼胞濕爛眵淚膠粘此乃脾胃中邪風積熱上
壅於目所致宜用通脾瀉胃湯散風清熱兩解其
邪

通脾瀉胃湯

方見黃膜上衝下

兩皆赤脈歌

皆赤病屬心經火大皆多實小皆虛實者洗心散歸芍
麻黃連芥大黃梔虛者九仙苓芥芍菊芍歸草芷通宜

註 皆赤之證赤脈起於大皆者心經之實火也赤脈起於小皆者心經之虛熱也實者用洗心散兩解其實邪虛者宜九仙散清降其虛熱也

七寶洗心散方

當歸 一錢

赤芍藥 一錢

麻黃 八分

黃連 一錢

荊芥 八分

大黃 一錢

梔子 一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服
九仙散方

黃芩

荊芥

赤芍藥

菊花

川芎

當歸

甘草

白芷

木通

各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後服

花翳白陷歌

花翳白陷在烏睛四圍漸起漫神瞳狀如棗花魚鱗翳
肺肝風熱腦中衝知母飲子防風桔知母消黃苓細朮
註花翳白陷者乃黑睛生翳風輪四圍漸起中間低
陷其翳狀如棗花魚鱗之形烏睛或白或帶微黃
此因肺肝積熱風邪上衝於腦所致宜用知母飲
子

知母飲子

防風

一錢五分

桔梗

一錢五分

知母

一錢

芒消

一錢

大黃

一錢五分

茯苓

一錢

細辛

一錢

羌蔚子

一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

黑翳如珠歌

黑翳如珠黑睛上形如珠子黑而圓淚出羞澀疼痛甚
大人肝腎虛風慙通明補腎丸可服小兒患此名眼疳

羚羊角飲消黃細知母羚羊防一併煎

註黑翳如珠之證黑睛上有黑翳圓如珠子之形淚
出羞澁難開疼痛極甚若大人患此證為肝腎虛
熱風邪宜用通明補腎丸小兒患此證為實熱眼
疳宜服羚羊角飲子泄其實熱也

通明補腎丸

方見五風初患不足下

羚羊角飲子

芒消 一錢

大黃 一錢

細辛 五分

知母 一錢

羚羊角 一錢

防風 二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠溫服

釘翳根深歌

釘翳根深睛内生
鞭似釘頭極痛疼
赤澁羞明時淚出
肝心毒熱上衝瞳
除熱飲子知母桔
消黃芩蔚黑苓風
註釘翳根深者
睛中翳黑鞭如釘
子之形其證疼痛

赤澁淚出差明此乃肝心毒熱上攻睛瞳宜服除熱飲子清瀉其毒熱也

除熱飲子

知母 二錢

桔梗 二錢

芒消 一錢

大黃 一錢

羌蔚子 一錢

黑參 二錢

黃芩 二錢

防風 一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

風牽喎僻歌

風牽喎僻臉癢赤陽明風熱刺精明內服排風蠅味蛇
天麻辛芍桔防風

註風牽喎僻之證臉皮癢赤時時口眼相牽而動此
乃陽明風熱上壅所致宜先用鍼刺精明穴外泄
其邪後服排風散內疎其風

排風散方

乾蠅

五味子

烏蛇 各一錢

天麻 二錢

細辛

白芍藥 炒

桔梗 各一錢

防風 二錢

右為細末令勻食後米飲調下三錢

冰瑕翳深歌

冰瑕翳深色微青橫貫烏睛珠癢疼淚眇赤脈緣肝熱
石燕丹宜外點靈內服荒蔚消黃細元芍知母殼防風
註冰瑕翳深之證翳色青白如冰橫貫烏睛其證或

癢或疼發歇無時眇黏淚出白睛赤脈此乃肝經之熱宜外點石燕丹內服羌蔚散

石燕丹

方見卷末

羌蔚散方

羌蔚子 二錢

芒消 一錢

大黃 一錢

細辛 五分

黑參 一錢

赤芍藥 一錢五分

知母 一錢

枳殼 一錢

防風 二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠溫服

兩瞼粘睛歌

兩瞼粘睛眵癢疼脾胃風溼熱甚成菊花通聖消黃桔
芍草荆歸膏薄荷麻苓梔滑翹防朮外加羌細菊蔓荆

註

兩瞼粘睛之證瞼内生瘡眵淚癢痛胞瞼粘合難
開此乃脾胃中風濕熱盛合邪上攻宜用防風通

聖散加羌活菊花細辛蔓荊子外散風邪內清邪熱

菊花通聖散方

芒消

五分

大黃

酒蒸五分

桔梗

一錢

白芍藥

炒五分

甘草

生一錢五分

荊芥穗

五分

當歸

五分

石膏

一錢

薄荷

五分

川芎

五分

麻黃 五分

黃芩 一錢

梔子 一錢

炒黑

滑石 二錢

連翹 五分

防風 五分

白朮 五分

炒

外加羌活細辛菊花蔓荊子各五分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

玉翳浮滿歌

玉翳浮滿時或疼風熱衝腦蓋瞳睛洗刀通聖羌獨細

疾元賊決蛻蔓青

註 玉翳浮滿之證初起時或疼痛黑睛上翳如玉色
遮蓋瞳人皆緣肝經熱極風熱衝腦所致宜用洗
刀散除風熱而消翳膜也

洗刀散方

即防風通聖散加羌活獨活細辛蒺藜元參木賊草
決明蟬蛻蔓荊子青箱子各一錢

膜入水輪歌

膜入水輪睛瘡後瘡愈坐翳侵水輪肺肝虛熱大腸燥
日久失治傷瞳神退熱飲軍茺蔚黑辛防五味桔黃芩
註膜入水輪者因黑白睛上生瘡而起愈後瘡痕不
沒漸生翳膜侵入水輪此乃肝經積熱大腸燥滯
邪熱上逆所致宜用退熱飲子清降其熱
退熱飲子

大黃 一錢

茺蔚子 二錢

黑參 一錢

細辛 一錢

防風 二錢

五味子 五分

桔梗 二錢

黃芩 二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

逆順生翳歌

逆順生翳上下生順則下垂逆上衝鉤割後用知母飲
知味軍芩車桔菴

註逆順生翳之證從上垂下侵入黑睛為順從下衝
上侵入黑睛為逆順則易安逆則難治並宜手法

鈎割去其翳膜後服知母飲子清其內熱

知母飲子

知母

二錢
炒

五味子

五分

大黃

一錢

黃芩

一錢

車前子

二錢

桔梗

一錢

羌蔚子

二錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

風牽臉出歌

風牽瞼出瞼皮翻胞瞼俱紅眵淚連胃經積熱肝風盛
劇洗去瘀病可痊後服黃耆湯蔚骨防苓苓草大黃煎
註風牽瞼出之證乃瞼皮翻出向外上下胞瞼俱赤
眵淚淋漓皆緣胃經積熱肝有風邪宜先用劇洗
去瘀後服黃耆湯清熱散邪也

黃耆湯方

黃耆 一錢

羌蔚子 二錢

地骨皮 一錢

防風 一錢五分

黃芩一錢

茯苓一錢

甘草五分

大黃一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

瞋生風粟椒瘡歌

椒瘡風粟瞋胞生多淚難睜摩澁疼脾經風熱粟黃軟
脾經溼熱椒鞭紅劇洗後用清脾飲知母翹軍生地風
黃芩玄粉黃連桔陳皮荊芥黑參靈

註椒瘡風粟之證或起於瞋邊或生於胞內皆淚多

難睜沙澁摩睛疼痛粟瘡如粟其形黃軟屬脾經
風熱而成椒瘡如椒其形紅鞭屬脾經溼熱而成
並宜劇洗出血服除風清脾飲椒瘡倍苓連生地
風粟倍荆芥防風

除風清脾飲

知母

連翹

大黃

生地黃

防風

黃芩

玄明粉

黃連

桔梗

陳皮

荊芥穗

黑參 各等分

右為粗末以水二盞煎至一盞去渣食遠溫服

混睛歌

混睛初起白睛混漸生赤脈遮瞳睛或混白膜漫珠上
白忌苔光赤散紅先癢後疼隱澁淚肝藏毒風劇洗通
後服地黃生熟地蒺藜當歸甘草通黃連木賊烏犀角

羌活玄參軍穀精

註混睛之證初起白睛混赤漸生赤脈遮漫烏睛或
白或赤漫珠一色白忌光滑如苔赤忌赤脈外散
其證初起則先癢後痛漸致礮澁淚出羞明隱痛
視物昏朦此乃肝藏毒風與瘀血上凝所致先宜
劇洗去瘀後服地黃散外點摩障靈光膏

地黃散方

生地黃 七錢

熟地黃 七錢
焙乾

白茯苓

炒四錢

當歸

七錢

甘草

炙五錢

木通

五錢

黃連

酒炒五錢

木賊

五錢

烏犀角

鎊五錢

羌活

五錢

玄參

五錢

大黃

七錢

穀精草

五錢

右為細末令勻每服三錢煮羊肝汁食遠調服

摩障靈光膏

方見卷末

被物撞破歌

被物撞破珠脹痛腫閉胞青
劇洗良外塗生地黃散
芎地 羚軍 芎殼 香

註被物撞破者或因打撲或因撞損睛珠脹痛眼胞
青紫腫閉難開先宜劇洗散瘀外敷搥爛生地黃
膏內服生地黃散

生地黃散方

川芎

生地黄

羚羊角

大黃

赤芍藥

枳殼

木香

各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

撞刺生翳歌

撞刺生翳遺刺痕日久血瘀障翳生赤脈澁疼經效散

柴軍歸芍草犀同

註撞刺生翳之證或被竹木簽刺成瘡因治療不淨
留痕日久瘀血凝積遂生翳膜赤脈滿目澁痛淚
出宜用經效散清熱散瘀也

經效散方

柴胡 二錢

大黃 一錢

當歸尾 一錢

赤芍藥 一錢

甘草梢 五分

犀角 一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

痛如鍼刺歌

痛如鍼刺心火熾睛珠如同鍼刺疼頭疼目眩眼系急
鍼後八正草梔燈桑車扁蓄滑生地竹葉生軍瞿麥通
註痛如鍼刺乃心經毒火上熾睛珠忽然極痛猶如
鍼刺微帶頭疼目眩眼系緊急先宜火鍼刺太陽
穴外散其邪後服加味八正散內泄其熱也

加味八正散方

甘草

梔子

燈心草

桑白皮

車前子

扁蓄

滑石

生地黃

苦竹葉

大黃

瞿麥

木通

各等分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

眼癢歌

眼癢皆因肝膽風癢生眇瞼黑白睛外用廣大重明洗

內服荊防羌烏芎

註眼癢之證皆因肝膽二經風邪衝發所致或在瞼
邊皆內甚則癢連睛珠癢極難忍外以廣大重明
湯薰洗內服驅風一字散疎散風邪

廣大重明湯

方見卷末

驅風一字散方

荊芥穗 五錢

防風 二兩五錢

羌活 二兩五錢

川烏 五錢
炮

川芎 五錢

右為細末令勻每服二錢食後薄荷湯調下

衝風淚出歌

風淚初起冬月甚久則冬夏淚濛濛肝虛冷淚不疼赤
實則熱淚腫紅疼虛用補肝歸白芍茯苓熟地木賊風
實用茶調荊薄草賊防羌決菊膏芎

註 衝風淚出之證見風淚出初起則冬月甚夏月輕

久則冬夏皆然此乃肝藏虛風邪熱所致若淚冷
不赤不痛為虛宜用補肝湯淚熱腫赤疼痛為實
宜用川芎茶調散

止淚補肝散方

當歸 二錢

白芍藥 一錢
炒

蒺藜 一錢

川芎 五分

熟地黄 二錢

木賊 一錢

防風 一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠去渣溫服

川芎茶調散方

荊芥

薄荷

甘草

炙

木賊

防風

羌活

石決明

煨

菊花

石膏

川芎

各一兩

右為細末令勻每服三錢食後茶清調下

風赤瘡癢歌

風赤瘡癢皆瞼生黑睛端好瞼爛紅脾經風熱宜急治
久生翳膜遮瞳睛加減四物湯生地苦參牛蒡薄荷風
當歸赤芍天花粉連翹荆芥穗川芎

註風赤瘡癢者起於兩眦其黑睛則端然無恙惟瞼
邊爛而紅赤此乃脾經風熱上攻所致宜急治之
久則恐生翳膜遮蓋睛瞳用加減四物湯

加減四物湯方

生地黃

苦參

牛蒡子

薄荷

防風

當歸

赤芍藥

天花粉

連翹

荊芥穗

川芎

各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

暴風客熱歌

暴風客熱胞腫疼淚多癢赤脹白睛原於肺熱召風鬱
菊花通聖可收功

註暴風客熱者胞腫疼淚多癢赤白睛脹起此證
原於肺客邪熱外召風邪先宜劇洗後用菊花通
聖散內清邪熱外散風邪也

菊花通聖散

方見兩瞼粘睛下

傷寒熱病後患目歌

傷寒餘熱過食辛腫散黑花澁淚頻紅腫痛用生犀飲
羚羊芩桔知苓參

註傷寒熱病後患目者因餘熱未清過食辛熱兩熱
合邪以致瞳人散大時見黑花隱澁淚多紅腫疼
痛宜用生犀飲清解其熱也

生犀飲

生犀角

二錢

羚羊角

一錢

防風

一錢

黃芩

一錢

桔梗 一錢五分

知母 一錢

茯苓 一錢

人參 一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

肝虛積熱歌

肝虛積熱頻發歇起初紅腫痛羞明年深生翳漸昏暗
青箱丸用兔絲苋生地青箱防五味黑柴澤瀉細車苓

註肝虛積熱之證時發時歇初則紅腫疼痛澀淚難

開久則漸重遂生翳膜視物昏暗宜用青箱子丸

治之

青箱丸方

兔絲子 一兩

菟藟子 一兩

生地黃 二兩

青箱子 二兩

防風 一兩

五味子 三錢

黑參 一兩

柴胡 一兩

澤瀉 一兩

細辛 三錢

車前子 一兩

茯苓 一兩

右為細末煉蜜為丸桐子大空心茶清送下三錢
因他患後生翳歌

因患病後生雲翳赤爛日久翳遮瞳心無黃赤猶能見
羊肝丸蒺藜川芎決地楮槐連五味荊歸甘草麝仁風
註因患他病後生翳者為患後生翳也初則赤爛日
久漸生雲翳遮蔽瞳人視無所見翳者當細看翳
心若不黃赤猶能通三光者可治宜常服羊肝丸
可愈

羊肝丸方

雄羊肝 一具

白蒺藜 一兩
炒去刺

菊花 一兩
去梗葉

川芎 三錢

石決明 一兩

生地黃 一兩

楮實子 五錢

槐角 五錢
炒

黃連 五錢

五味子 五錢

荊芥穗 二錢五分

當歸尾 五錢

甘草 五錢

麩仁 七錢
去殼油

防風二錢

右為細末雄羊肝一具滾水沸過和前藥搗為丸如桐子大每服五六十丸空心薄荷湯下

脾生痰核歌

脾生痰核痰火結核形如豆堅不疼失治成癭流膿血
防風散結芷苓風黑桔前胡陳赤芍浙貝蒼朮花粉同
註脾生痰核之證因痰火結聚而成生於胞外皮內
核形如豆堅韌不疼宜用防風散結湯化痰散熱

若久而不治漸長為癭破則成漏為難治矣

防風散結湯方

白芷

黃芩

防風

黑參

桔梗

前胡

陳皮

赤芍藥

浙貝母

蒼朮

天花粉

各八分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

天行赤眼歌

天行赤眼四時生傳染熱淚腫赤疼受邪淺深隨人化
驅風散熱飲防風牛蒡將軍羌赤芍連翹梔薄草歸芍

註

天行赤眼者四時流行風熱之毒傳染而成老幼
相傳沿門逐戶赤腫澁淚羞明疼痛受邪淺深視
人強弱強者先愈弱者遲愈宜用驅風散熱飲風
盛倍羌防熱盛倍大黃

驅風散熱飲

防風

牛蒡子

炒研

大黃

酒浸

羌活

赤芍藥

連翹

梔子

炒

薄荷

各一錢

甘草

五分

當歸尾

川芎

各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

小兒青盲歌

小兒青盲胎受風瞳子端然視物矇明目羊肝桂栢味
細菊羌連白朮同

註小兒青盲者因胎受風邪生後瞳人端好黑白分
明惟視物不見有時夜卧多驚嘔吐痰涎黃汁宜
用鎮肝明目羊肝丸久服可愈

鎮肝明目羊肝丸方

羯羊肝

一具
切片

用新瓦盆焙乾如大只用一半竹刀

官桂

栢子仁

五味子

細辛

菊花

羌活 各五錢

黃連 七錢炒

白朮 五錢

右為細末煉蜜為丸如桐子大沸湯研調空心服
一錢

胎風赤爛歌

胎風赤爛緣胎熱目赤眵黏皆爛紅小防風湯羌梔草

歸尾將軍赤芍風

註胎風赤爛之證因在母腹其母過食辛熱或生後乳母過食辛熱致令小兒雙目盡赤眵淚膠黏四皆濕爛宜用小防風湯治之

小防風湯方

羌活

梔子

甘草

當歸尾

大黃

赤芍藥

防風 各五分

右為粗末以水一盞半煎至五分空心溫服

癰瘡入眼歌

小兒癰瘡入眼中赤腫難開澁淚疼久生雲翳如銀色
肝經餘熱上衝睛紅花散用草歸地赤芍軍翹紫草紅
註小兒癰瘡之證因患痘時瘡生眼中赤腫難開澁
淚羞明疼痛久則生翳如銀色此乃痘後肝經餘
熱上攻睛瞳所致宜用紅花散清熱散瘀其證自

愈

紅花散方

甘草

當歸尾

生地黃

赤芍藥

大黃

連翹

紫草

紅花 各五分

右為粗末燈心草十莖竹葉十片為引以水一盞
半煎至五分食遠去渣溫服

輓轡轉關歌

輓轡轉關肝風盛旋轉睛珠輓轡同輕則瞳斜重反背
初起鈎藤飲蠍芍參防二麻殭蠶草後服天冬飲赤苓
羌活天冬五味子人參知母蔚防風

註輓轡轉關之證因肝經風邪壅盛以致二目睛珠
旋轉不定與輓轡相同輕則瞳人偏斜重則瞳人
反背初起宜用鈎藤飲疎散風邪定後用天門冬
飲調理即愈

鈎藤飲

鈎藤 五分

全蠍 一錢
炒去毒

川芎

人參

防風 各七分

麻黃 三分

天麻 七分

殭蠶 一錢二分
炒

甘草 三分
炙

右為粗末以水二盞煎至一盞去渣不拘時服

天門冬飲

赤茯苓

七分

羌活

七分

天門冬

一錢

五味子

五分

人參

七分

知母

一錢

羌蔚子

一錢

防風

五分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

小兒生贅歌

小兒生贅生臉內初小漸大隱摩腫赤澁淚多脾胃熱
鈎割劇洗去瘀紅清胃散用車前子膏軍柴枯黑苓風

註小兒生贅之證生於眼胞之內初起如麻子久則漸長如豆隱摩瞳人赤澁淚出此乃脾胃積熱上壅所致先用手法或鈎割或劇洗散去外瘀後用清胃散清其內熱

清胃散方

車前子

石膏

大黃

柴胡

桔梗

黑參

黃芩

防風 各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

小兒疳眼歌

小兒疳眼肝脾病腫疼澁淚翳遮瞳咬甲揉鼻合面卧
肥兒神麥萸連同

註 小兒疳眼者初因飲食傷脾久則肝熱上衝腫痛

難開隱澁淚多漸生白膜雲翳遮睛外則掃眉咬
甲揉鼻喜合面而卧不喜擡頭宜用四味肥兒丸

久服即效

四味肥兒丸方

神麴

炒

麥芽

炒

蕪荑

黃連

炒 各等分

右為細末令勻水糊為丸桐子大每服一錢空心
白湯送下

小兒通睛歌

小兒通睛因驚振看東反西視斜偏牛黃珠麝竺金黛

地龍蘇附珀油蠶

註小兒通睛之證或因驚恐或緣擊振致雙目睛通
瞻視偏斜看東反西視左反右急用牛黃丸疎風
鎮驚久則即成難治之證

牛黃丸方

牛黃 三錢

珍珠 三錢

麝香 少許

天竺黃 三錢

金鉞 量加
為衣

青黛 三錢

地龍 三錢

蘇合油 五錢

白附子 三錢

琥珀 三錢

香油 五錢

殭蠶 三錢

以上九味各另研極細共為一處用細甘草稍一兩煎汁次入蘇合油香油兌均和藥為丸黃豆大
金鉞為衣薄荷湯化下一丸忌一切酒麵辛熱生痰等物

眯目飛塵飛絲歌

眯目塵絲入目中淚澁難開睛痛疼初宜外治久生翳
酒調散用草歸朮螵蛸赤芍蒼朮桔翹麻羌活大黃同
註眯目者或飛塵飛絲風吹入目也其證淚多隱澁
難開睛珠疼痛初得時宜翻轉眼睥用綿裹釵腳
撥出眯物若日久生雲翳者宜用酒調散治之

酒調散方

甘草

當歸

羌蔚子

桑螵蛸

赤芍藥

蒼朮

菊花

桔梗

連翹

麻黃

羌活

大黃

各一兩

右為細末每服三錢酒調下不拘時服

補遺

能遠怯近歌

近視昏矇遠視明陽光有餘損陰精須用地芝丸枳殼
菊花生地共天冬

註能遠怯近者謂視物遠則能見近則昏矇也蓋由
其人陽氣有餘陰精不足故光華散亂不能收斂
於近也宜用地芝丸養陰久服則目自愈

地芝丸方

枳殼

去穰

菊花

各三兩

生地黄

焙乾

天門冬

各四兩
去心

右為細末煉蜜為丸桐子大每服百丸食後茶清送下

能近怯遠歌

近視清明遠視昏陽光不足被陰侵定志丸用菖蒲遠
硃砂人參白茯苓

註能近怯遠者非生成近視謂平昔無此證忽視物

近則明了遠則昏暗也由其人陰氣偏盛陽氣不足陽被陰侵是以光華不能發越於遠也宜定志丸補心壯神神足則自能遠視矣

定志丸方

菖蒲 二兩

遠志 二兩
去心

硃砂 三錢
研細另用

人參 一兩

白茯苓 一兩

右為細末煉蜜為丸桐子大以硃砂為衣每服五

十九食後米飲湯送下

瞳神散大歌

瞳神散大風輪窄邪熱蒸之風氣攻或因思怒痰寒瘧
地黃丸內芍歸芎防己丹柴知二地丹參獨蘘味寒荒

註瞳神散大者謂瞳神散大風輪反為窄窄一週甚
則一週如線乃邪熱內蒸風氣上攻所致亦有因
憂思氣怒痰火傷寒瘧疾經產敗血等證而成宜
用地黃丸

地黃丸方

一名羌活退翳丸

白芍藥

一兩三錢
酒炒

當歸身

五錢
酒炒

川芎

三錢
酒洗

防己

二錢
酒製

牡丹皮

三錢
酒洗

柴胡

三錢

知母

三錢
鹽水炒

熟地黃

八錢
焙

生地黃

八錢

丹參

五錢

獨活

三錢

黃蘗

五錢
酒製

五味子

三錢

寒水石

三錢

羌蔚子 五錢

右為細末煉蜜為丸桐子大每服三錢空心白滾湯送下

瞳神縮小歌

瞳神縮小如鍼簪勞傷精血損腎肝視不甚昏微隱澁
清腎抑陽黃蘗連草決苓歸生地芍獨活知母枸杞寒
註 瞳神縮小者謂瞳神漸漸縮小如簪脚甚則如鍼
乃淫慾勞傷精血虧損腎肝二經所致其證視物

不甚昏惟覺羞明隱澁宜用清腎抑陽丸壯水以制陽也

清腎抑陽丸方

黃蘗

二兩
鹽水製

黃連

二兩
酒炒

草決明

一兩
炒

白茯苓

二兩

當歸

一兩
酒洗炒

生地黃

二兩

白芍藥

一兩
酒炒

獨活

八錢

知母

二兩
鹽水製

枸杞子

二兩

寒水石

二兩
另研

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三錢空心白

滾湯送下

乾澁昏花歌

乾澁昏花肝腎病酒色勞瞻思慮傷四物五子車前子
覆盆枸杞兔絲當熟地川芎芍地膚五膽膏宜外點良
註乾澁昏花者謂目覺乾澁不爽視物昏花也此乃
肝腎俱傷之候或因嗜酒恣慾或勞瞻竭視或思

慮太過皆成此證宜用四物五子丸滋陰養水畧帶抑火以培其本也

四物五子丸方

車前子

酒蒸

覆盆子

枸杞子

兔絲子

酒煮爛

當歸

酒洗

熟地黄

川芎

白芍藥

地膚子

各等分

右為細末煉蜜為丸桐子大每服二錢不拘時鹽湯送下

五膽膏

方見卷末

白眼痛歌

白眼痛病不紅腫紅絲赤脈沙澁疼肺脾濕熱兼伏火
須辨赤脈三陽經桑皮湯澤元苓桔菊草旋苓桑麥冬
註白眼痛者俗呼為害白眼其證不紅不腫沙澁疼

痛多生紅絲赤脈乃脾肺絡傷濕熱兼氣分伏火
上衝所致須看赤脈紅絲以辨三陽從上而下者
太陽也羌活為使從下而上者陽明也升麻為使
從外至內者少陽也柴胡為使宜桑白皮湯主之

桑白皮湯方

澤瀉 八分

元參 八分

黃芩 一錢

桔梗 七分

菊花 五分

甘草 二分半

旋覆花 一錢

茯苓 七分

桑白皮 七分

麥門冬 一錢
去心

右為粗末以水二盞煎至一盞去渣溫服

女子逆經歌

女子逆經血灌瞳滿眼如朱努肉生總因血熱經阻逆
通經蘇木大黃紅苓連羌薄梔香附生地歸芍賊草芎

註女子逆經之證乃血逆上行衝灌瞳人以致滿眼

赤澁或生努肉總由血熱經阻不行因而上逆也

宜用通經散破血通經其血翳自退

通經散方

蘇木 一兩

大黃 五錢

紅花 一兩

黃芩 二兩

黃連

羌活

薄荷

黑梔子

香附

生地黃

當歸

赤芍藥

木賊

甘草

川芎 各一兩

右為粗末令勻每服五錢以水一盞半煎至七分
食後去渣溫服

行經目痛歌

女子行經目澁疼眩暈頭疼雲翳生去血過多肝藏損
當歸補血薄羌活柴胡蒺藜菊防草生地當歸白芍芎
註行經目痛者女子遇經行之際眼白澁痛頭疼眩

暈腫澁難開生翳於黑睛上或如粟米或花翳白陷此因經行去血過多肝經虛損故也宜用當歸補血湯治之

當歸補血湯方

薄荷

五分

羌活

五分

羌蔚子

一錢

柴胡

八分

蒺藜

一錢

菊花

八分

防風

八分

甘草

四分

生地黃 二錢

當歸 一錢五分

白芍藥 一錢

川芎 八分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

妊娠目病歌

妊娠目病有餘證須辨氣分血分醫氣分旋螺瞳散大
天冬飲用茯苓知羌活防風參五味血分瘀血並凝脂
保胎芩芥歸芍草連翹芎地縮陳皮

註 妊娠目病者為有餘之證有氣分血分之別屬氣

分者多見旋螺瞳人散大乃氣分之熱宜天門冬
飲屬血分者多生瘀血凝脂翳障乃血分之熱宜
用保胎清火湯以治之

天門冬飲

天門冬 一錢五分 茯苓 一錢

知母 一錢五分 羌活 五分

防風 五分 人參 五分

五味子 五分

右為粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

保胎清火湯方

黃芩 一錢二分

荊芥穗

當歸身

白芍藥 各一錢

甘草 三分

連翹 一錢

川芎 八分

生地黃

縮砂仁

陳皮 各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠去渣溫服

產後病目歌

產後患目血不足病有三因治可通思哭勞瞻多內障
嗜辛厚味外障成外因頭風風爛濕四物補肝香附芎
夏枯熟地歸芍草隨人加減可收功

註產後患目乃去血過多不足之證病雖有三因之
別而治法可以加減變通內因者多緣思慮哭泣
或竭視勞瞻致成內障須四物補肝湯倍熟地芎
歸外因者因嗜辛辣厚味或因頭風致成風赤濕

爛宜本方倍香附川芎夏枯草隨證加減以治之

四物補肝湯方

香附

酒製一錢五分

川芎

一錢

夏枯草

二錢

熟地黄

焙乾四錢

當歸身

酒洗二錢

白芍藥

酒洗一錢五分

甘草

炙五分

右為粗末以水二盞煎至一盞食遠去渣溫服

附外治方

煖腫膏方

膩粉少許

黃蠟

代赭石

各五錢
研

細磁末

黃蘗

細末

麻油各一兩

右為極細末入銅杓內入油蠟同煎為膏塗患處

紫金膏方

爐甘石

爐甘石入大銀罐內鹽泥封固用炭火煨一炷香以罐通紅為度取起為末用黃連水飛

過再入黃芩黃連黃蘗湯內將湯煮乾以甘石如松花色四兩

黃丹

起入鍋內炒黑色用草試之草灼提
如此三次研極細末水飛四兩

硼砂

三錢
研細飛過

硃砂

三錢
研細飛過

輕粉

五分

青鹽

五分
水洗去泥

珍珠

三錢

白丁香

五分
乳汁化開去渣

沒藥

五分

乳香

五分

海螵蛸

二錢
去皮研細

枯礬

五分

礞砂

五分

當歸

五分
研細

川芎

五分
研細

黃連

五分
研細

甘草

研細五分

麝香

五分

冰片

五分

如法炮製各研極細無聲用好白蜜十五兩入鍋
內熬去沫只用白蜜十兩先下爐甘石攪勻次下
黃丹攪勻再下諸藥不住手攪勻如紫金色不粘
手為度

石燕丹方

爐甘石

爐甘石入大銀罐內鹽泥封固用炭火煨一
炷香以罐通紅為度取起為末用黃連水飛

過再入黃芩黃連黃蘗湯內將
湯煮乾以甘石如松花色四兩

礪砂

銅杓內同
水煮乾

石燕

琥珀

硃砂

水飛各取淨
末一錢五分

鷹屎白

一錢如無白
丁香代之

冰片

麝香

各分半

右為極細末研至無聲每用少許水蘸點眼大眚

枯澁無淚加熊膽白蜜

血翳加真阿魏

黃翳加鷄內金

風熱翳加麤仁

熱翳加珍珠牛黃

冷翳加附子尖雄黃

老翳倍硼砂加豬脰子

摩風膏方

黃連

細辛

當歸

杏仁

去皮尖為霜

防風

松脂 各五錢

白芷

黃蠟 各一兩

麻油

四兩

先將蠟油溶化前藥共研為細末慢火熬膏貼太

陽穴

摩障靈光膏方

黃連

剉如豆大一兩童便
浸一宿曬乾為末

黃丹

三兩
水飛

當歸

二錢
酒洗

麝香 五分

乳香 五分

輕粉 一錢

硃砂 一錢

白丁香 一錢

龍腦 一錢

海螵蛸 一錢

另研細末

爐甘石

六兩以黃連一兩煎水淬七次研細

先用好白蜜十兩熬五七沸以淨紙搭去蠟面除

黃丹外下餘藥用柳木攪勻次下黃丹再攪慢火

徐徐攪至紫色却將乳香麝香輕粉硃砂和勻入

上藥內以不粘手為度

廣大重明湯方

防風

菊花

龍膽草

甘草

細辛

各等分

右為粗末水一盞煎半盞去渣帶熱薰洗

五膽膏方

豬膽汁

黃牛膽汁

羊膽汁

鯉魚膽汁

各二錢五分

白蜜 二兩

胡黃連 研末

青皮 研末


川黃連 研末

熊膽 各二錢五分

右將諸藥末與蜜並膽汁和勻入磁瓶內以細紙封頭牢繫坐飯甌中蒸待飯熟為度



御纂醫宗金鑑卷七十八



總校官庶吉士臣張能照
校對官編修臣楊壽楠
謄錄監生臣高瑞相